

## Protocol krentenbaard

### **Wat is het?**

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. Soms verschijnt de infectie op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn zoals bij eczeem of muggenbulten. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen.

#### De verschijnselen zijn:

- in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een gele korst ontstaat; vervolgens breiden de plekken zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een 'baard' van krenten heeft.

### **Hoe krijg je het?**

Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Besmetting kan plaatsvinden via de handen. Het kind kan ook zichzelf her-inficeren door aan de plekken te krabben. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie dan volwassenen omdat hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica.

### **Melding bij de GGD**

Huiduitslag moet gemeld worden als er binnen twee weken twee of meer gevallen van dezelfde vorm van huiduitslag in een groep zijn.

### **Wering**

Kinderen mogen direct na de start van de behandeling met zalf/antibiotica naar de kinderopvang. Het is niet wenselijk de blaasjes af te plakken met een pleister, omdat hierdoor 'broei' kan optreden en de krentenbaard zal uitbreiden. Toch vragen wij als kinderopvang wanneer de blaasjes niet afgedekt kunnen worden met kleding het af te plakken met een pleister. Dit i.v.m. dat krentenbaard zeer besmettelijk is.